



## تنبيهات زراعية

### البياض الزغبي (الميلديا) على البطاطا الموسمية

16/04/2026

رصدت شبكة المراقبة للمعهد الوطني لحماية النباتات، أولى الإصابات بمرض البياض الزغبي على أوراق البطاطا الموسمية بولايات مستغانم، معسكر، وهران و الشلف و التي تتواجد حاليا في "مرحلة النمو النباتي" الى "تكون الدرنات" اضافة الى أن العوامل المناخية الحالية جد ملائمة لتطور هذا المرض الوبائي.

لهذا الغرض ننصح بشدة مزارعي البطاطا الموسمية الذين لاحظوا أعراض هذا المرض بالتدخل السريع بواسطة مكافحة العلاجية عن طريق رش المبيدات الفطرية الملائمة و المرخصة، بينما يتوجب على الفلاحين الذين لم يلاحظوا هذه الأعراض القيام بالعلاج الوقائي.





| الإسم التجاري<br>Nom commercial | المادة الفعالة<br>Matière active           | الجرعة<br>Dose d'utilisation |
|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| ACROBATE CU                     | DIMETHOMORPHE + OXYCHLORURE DE CUIVRE      | 2,5 kg/ha                    |
| AGRIXYL 410                     | Mono et Dipotas-sium phosphate + Metalaxyl | 2,5-4 L/Ha                   |
| ALCOCOBRE 50 PM                 | OXYCHLORURE DE CUIVRE                      | 0,3-0,4 k g/hl               |
| AMISTAR® TOP                    | AZOXYSTROBINE + DIFENOCONAZOLE             | 1L /ha                       |
| AMIX                            | SULFATE DE CUIVRE                          | 25 kg/ha                     |
| ARMETIL CUIVRE                  | OXYCHLORURE DE CUIVRE+ METALAXYL           | 250g/hl                      |
| AZOLE                           | AZOXYSTROBINE                              | 80-120ml/hl                  |
| BANAL                           | TEBUCONAZOLE                               | 0,6-1 kg/ha                  |
| BIOCUIVRE                       | CUIVRE                                     | 10-15 kg/ha                  |
| BOMA 25 SC                      | AZOXYSTROBINE                              | 80-120 ml/hl                 |
| BOUILLIE BORDELAISE ALPHYT      | SULFATE DE CUIVRE                          | 1,25 kg/ha                   |
| BOUILLIE BORDELAISE WG          | OXYCHLORUR DE CUIVRE                       | 15 kg/Ha                     |
| CABRIO DUO                      | DIMETHOMORPHE + PYRACLOSTROBINE            | 2,5 l/ha                     |
| CALDO BORDELES                  | SULFATE DE CUIVRE                          | 1,25 kg/hl                   |
| CAPTAN 50 VALLES                | CAPTAN                                     | 300 g/hl                     |
| CARIAI                          | MANDIPROPA-MID+ CUIVRE                     | 4 -5 Kg/Ha                   |
| CHAMP FLO                       | HYDROXYDE DE CUIVRE                        | 2-4 L/Ha                     |
| COBRE LAINCO                    | OXYCHLORURE DE CUIVRE                      | 3 - 4 kg/Ha                  |
| COMAC                           | SULFATE DE CUIVRE NEUTRALISE A LA CHAUX    | 6,5 kg/Ha                    |
| CONSENTO 450 SC                 | FENAMIDONE + PROPAMOCARBE HCL              | 1,5-2 L/Ha                   |
| COPERMAC                        | OXYCHLORURE DE CUIVRE                      | 0,3-0,4 Kg/hl                |
| CUIVRAT                         | OXYCHLORURE DE CUIVRE                      | 0,3-0,4 Kg/hl                |
| CUIVROCHIM                      | CYMOXANIL + OXYCHLORURE DE CUIVRE          | 250-300 g/hl                 |
| CUIVROXY                        | OXYCHLORURE DE CUIVRE                      | 0,3-0,4 Kg/hl                |
| CUIVROXY 50 WP                  | OXYCHLORURE DE CUIVRE                      | 0,3-0,4 Kg /hl               |
| CUPERTINE® SUPER                | Bouillie bordelaise + CYMOXANIL            | 400G/hl                      |
| CUPROCAF-FARO                   | CUIVRE DE L'OXYCHLORURE DE CUIVRE          | 300 à 500 g/ hl 3 à 4 Kg/ha  |
| CUPROSATE C                     | CYMOXANIL + OXYCHLORURE DE CUIVRE          | 2,5-3 Kg/Ha                  |
| CUPROXY 50 WP                   | OXYCHLORURE DE CUIVRE                      | 0,3 à 0,4 kg/hl              |
| CURENOX50                       | OXYCHLORURE DE CUIVRE                      | 0,3-0,4 kg/hl                |

| الإسم التجاري<br>Nom commercial | المادة الفعالة<br>Matière active         | الجرعة<br>Dose d'utilisation   |
|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| CURZATE-R WP                    | CYMOXANYL+ OXYCHLORURE DE CUIVRE         | 250-300 g/hl                   |
| CYMBAL 45                       | CYMOXANIL                                | 0,25 kg/ha                     |
| DEKAFATE                        | CYMOXANIL + SULFATE DE CUIVRE            | 750 g/ha                       |
| ELECTIS D                       | ZOXAMIDE + DIMETHOMORPHE                 | 1 L/ha                         |
| ETABOXAM 10% SC                 | ETHABOXAM                                | 2 L/Ha                         |
| FOLIETTE                        | FOSETHYL - ALUMINIUM                     | 0,25 kg/hl                     |
| FOSETOP                         | FOSETHYL- ALUMINIUM                      | 2,5 kg/ha                      |
| FOUETTE                         | FOSETHYL-ALU-MINIUM                      | 0,25 kg/hl                     |
| FUNGOROS0                       | CAPTAN                                   | 200-350 g/hl                   |
| FUNGOROS1                       | CAPTAN                                   | 200-350 g/hl                   |
| GOLDEN COP                      | OXYCHLORURE DE CUIVRE                    | 0,3-0,4 Kg/hl                  |
| INACOP                          | OXYCHLORURE DE CUIVRE                    | 300 à 400 g/ hl 300 à 500 g/hl |
| INACOPL                         | OXYCHLORURE DE CUIVRE                    | 0,2-0,3 L/hl                   |
| INFINITO 687,5 SC               | PROPAMOCARB HYDROCHLORIDE + FLUOPICOLIDE | 1,5 L/Ha                       |
| KOCIDE 2000                     | HYDROXYDE DE CUIVRE                      | 150 g/hl                       |
| MALVIN 80 WG                    | CAPTAN                                   | 200 g/hl                       |
| MELODY® COMPACT                 | IPROVALICARBE +OXYCHLORURE DE CUIVRE     | 1,75 kg/Ha                     |
| MILDIO STOP                     | PROPAMOCARBE                             | 3L/Ha                          |
| NATURAM 5                       | SULFATE DE CUIVRE                        | 2,5 L/ha                       |
| NEORAM WG                       | OXYCHLORURE DE CUIVRE                    | 0,3-0,4 kg/hl                  |
| OROCOBRE 50                     | OXYCHLORURE DE CUIVRE                    | 0,3-0,4 kg/hl                  |
| OXYCURE 50%                     | OXYCHLORURE DE CUIVRE                    | 3à 4 Kg/Ha 300 à 500 g/hl      |
| PHYTAZOX 25% SC                 | AZOXYSTROBINE                            | 0,8 à 1L/HA                    |
| POLTIGLIA CAFFARO 21            | BOUILLIE BORDELAISE                      | 700-1200 g/hl                  |
| PREVICUR ENERGLY 840            | FOSETYL- ALUMINIUM + PROPAMOCARB         | 2 à 2,5 L/Ha                   |
| PROCURE 722 SL                  | PROPAMOCARBE Hydrochloride               | 1 L/Ha                         |
| PROPLANT                        | PROPAMOCARB HCL                          | 2-4 L/m2                       |
| PROPLANT                        | PROPAMOCARB HCL                          | 100-150 ml/ Plantule           |
| REVUS                           | MANDIPROPAMID                            | 0,5 L/Ha                       |
| ROZATE WP                       | CYMOXANIL+OXYCHLORURE DE CUIVRE          | 250-300 g/hl                   |
| SEMIPLANT                       | PROPAMOCARBE HCl                         | 2-4 L/m²                       |
| SEMIPLANT                       | PROPAMOCARBE HCl                         | 100-150 ml/plantule            |
| STARLIGHT                       | BOUILLE BORDELAISE                       | 0,75 kg/ha                     |
| STRIMACH 25 SC                  | AZOXYSTROBINE                            | 70 ml/hl                       |
| TOUTIA PLUS                     | OXYCHLORURE DE CUIVRE                    | 3-4 kg/hl                      |
| VERITA FLASH                    | FENAMIDONE FOSTYL ALUMINIUM              | 2 kg/Ha                        |
| VITRA 50 WP                     | HYDROXYDE DE CUIVRE                      | 6 à 10 Kg/ha                   |